




# BUDESONIDA NA ESOFAGITE EOSINOFÍLICA



Esofagite Eosinofílica

Budesonida em veículo viscoso

## Esofagite Eosinofílica

A esofagite eosinofílica é uma condição inflamatória crônica do esôfago, caracterizada por infiltração significativa e isolada de eosinófilos na mucosa esofágica associada a sintomatologia clínica de disfunção desse órgão. É uma importante causa de disfagia e impacto alimentar em adultos, sendo considerada a segunda causa mais comum de esofagite crônica, após o refluxo gastro esofágico.

## Efeitos adversos e recomendações importantes

Os corticosteroides tópicos suprimem, mas não resolvem o processo de doença subjacente na EoE. Devido às altas taxas de recaída após a descontinuação do tratamento, uma terapia de manutenção a longo prazo é provavelmente necessária para a maioria dos pacientes. Os relatórios sugerem que a terapia de manutenção é bem tolerada e benéfica em crianças e adultos, mas existem preocupações sobre o uso a longo prazo de corticosteroides tópicos. Alguns estudos não encontraram efeitos adversos significativos, efeitos clínicos ou na mucosa após 1 ano de tratamento e eventos adversos relatados são geralmente leves a moderados. No entanto, os efeitos colaterais incluem infecções fúngicas e virais do trato alimentar superior, no trato respiratório, boca seca transitória, pirexia e tosse, e, mais recentemente, tem havido preocupações sob supressão do eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal.

Duração do tratamento é de 12 a 24 semanas, ou conforme avaliação médica e outras patologias associadas.

## Modo de Uso

A dose recomendada de budesonida é de 1 a 2mg ao dia, conforme orientação médica.

A suspensão viscosa oral de budesonida é uma novo medicamento mucoaderente manipulado, uma formulação tópica desenvolvida especificamente para o tratamento da esofagite eosinofílica. Isto demonstrou melhorar a disfagia e e características endoscópicas em adolescentes e adultos.

## Tratamento com Budesonida

A Budesonida é um dos corticoides mais usados no tratamento da Esofagite eosinofílica.

A viscosidade da medicação é considerado um aspecto importante do tratamento para dar mais tempo de contato com superfície do esôfago. Estudos mostram que a forma viscosa oral de budesonida foi mais eficaz do que a utilização de spray dosimetrado deglutiido.

O gel viscoso desenvolvido na Farmácia Doce Erva tem sabor agradável e viscosidade adequada que garante eficácia no tratamento e adesão do paciente.

## Sugestão de Fórmula

### Budesonida na Esofagite Eosinofílica

Budesonida	1 mg/dose
------------	-----------

Suspensão oral viscosa sabor laranja qsp 5 ml
---

Embalagem para 150 ml
-----------------------

Posologia: Tomar 1 colher medida (5 ml) por vez, deglutiindo lentamente.
--

Obs.: Sabor é opcional.
-------------------------

### Referências Bibliográficas:

DELLON, Evan S. et al. Safety and efficacy of budesonide oral suspension maintenance therapy in patients with eosinophilic esophagitis. *Clinical Gastroenterology and Hepatology*, v. 17, n. 4, p. 666-673. e8, 2019.

