




Gutcare



Melhora dos sintomas do TGI

Regulador das funções Gastrointestinais

Descrição

A ativo obtido a partir do **extrato de alcaçuz (Glycyrrhiza glabra)**, conhecido como Licorice ou Liquorice.

Efeitos são potencializados através da sua **duplicada padronização em 10% flavonoides e 3,5% de glabridina**.

Possui **baixo teor de ácido glicirrícico**, o que proporciona segurança a pacientes hipertensos.

Mecanismo de ação

Esvaziamento do estômago e motilidade intestinal

Sua ação agonista em receptores muscarínicos do tipo M3 permite o **aumento da contração da musculatura gástrica e intestinal**, o que favorece o **esvaziamento** do estômago e o aumento da motilidade do intestino.

Controle de úlceras por Helicobacter pylori

Age de forma sinérgica no combate à H. pylori por meio de processo **inibitório das sínteses proteicas, DNA girasse** (enzima responsável pela manutenção do material genético, essencial para a estabilidade bacteriana) e **dihidrofolato redutase** (enzima necessária para a síntese de nucleotídeos e aminoácidos). Além do efeito inibidor proteico, os compostos presentes são responsáveis por **ação redutora do processo inflamatório**.

Indicações

- Melhora de casos de dispepsia funcional, sintomas da síndrome do intestino irritável, úlceras gástricas causadas pela presença da bactéria H. pylori
- Melhora na digestão e no funcionamento natural do intestino
- Melhorando sintomas de indigestão, azia, dores abdominais e desconforto gastrointestinal.

Posologia

Ingerir uma dose de 75 mg GutCare duas vezes ao dia (ou uma dose 150 mg, uma vez ao dia), preferencialmente antes das refeições.

Dispepsia Funcional

As dispepsias são complicações que afetam o trato gastrointestinal e são divididas em dois grandes grupos, a dispepsia orgânica e a dispepsia funcional.

A dispepsia orgânica é caracterizada como um conjunto de sintomatologia causadas por fatores já instalados no organismo, como as úlceras pépticas, esofagite, câncer gástrico e coletividade.

Por outro lado, a **dispepsia funcional não possui causa específica** e seu diagnóstico é caracterizado pela presença persistente de sintomas que afetam negativamente o estômago e intestino. Sintomas: **dor/desconforto abdominal superior, com a presença de peso epigástrico pós-prandial e/ou saciedade precoce e/ou náuseas e/ou vômitos e/ou distensão abdominal** (SILVA et al. 2006).

Sugestões de Fórmulas

Melhora dos sintomas da Dispepsia Funcional	
GutCare	75 mg
Posologia: Consumir 1 dose, 2 vezes ao dia, antes das principais refeições	

Gut SOS	
GutCare	150 mg
Glutamina	3 g
Goma Acacia	3 g
Beta glucana	200 mg
Zinco glicina taste free	15 mg
Curcuma longa	300 mg
Sabor uva	qs
30 sachês	
Posologia: Consumir 1 dose, 1 vez ao dia, diluída em água	

